

ด่วนที่สุด

ที่ พง ๐๐๓๓.๐๐๒/ จตว ๐๔



ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา-ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้เร่งรัดและดำเนินงานวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้วัคซีนโควิด ๑๙ ประจำปี (๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)

จำนวน ๑ แผ่น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทยในช่วงฤดูฝน พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เช่น ในค่ายบำบัดยาเสพติด เรือนจำ โรงงาน สถานประกอบการ โรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับระบบสาธารณสุขของประเทศได้ ที่ผ่านมการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีนโยบายจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป

ในการนี้จังหวัดพังงา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือ เร่งรัดการฉีดวัคซีนในสถานที่ต่างๆดังนี้

๑. โรงเรียนและสถานที่ศึกษา ให้ครอบคลุมถึงโรงเรียนที่ยังไม่พบการระบาดของโรคโควิด ๑๙

๒. โรงงานและสถานประกอบการ

๓. เรือนจำ ค่ายบำบัดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม

ทั้งนี้ขอให้หน่วยบริการ ให้บริการฉีดวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีน โควิด ๑๙ ประจำปี และเร่งรัดการฉีดวัคซีนในสถานที่ต่างๆ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช จตุรบัณฑิต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา,
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๑ ต่อ ๑๔๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๔



แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ประจำปี (2566-2567)

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 5 เมษายน 2566

มติที่ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 และครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

มติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์: เพื่อลดการป่วยรุนแรง/เสียชีวิต และรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ

หลักการให้วัคซีน* : 1. วัคซีนทุกชนิด และทุกรุ่น สามารถนำมาฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้ ตามช่วงอายุที่ขึ้นทะเบียน

2. แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ก่อนถึงช่วงที่คาดว่าจะระบาด (ฤดูฝน)

*ผลการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรไทยอายุ 7 ปีขึ้นไป พบว่ามีภูมิคุ้มกันร้อยละ 94 จากการติดเชื้อและรับวัคซีน (ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา)

กลุ่มเป้าหมาย	นโยบายการให้บริการบุคคล และไม่เคยติดเชื้อ	เกณฑ์การวัดผลกระทบ หรือเคยติดเชื้อ
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง - เสี่ยงสูงต่อป่วยรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ กลุ่ม 607 หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือน** - 5 ปี - เสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อ เช่น พนักงานบริการหรือผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสคนเป็นจำนวนมาก หรือผู้อยู่ในสถานที่แออัด เช่น หอพัก	ฉีด 2 เข็ม ห่าง 1-2 เดือน (primary series)	ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม ต่อปี (booster) (กลุ่ม 607 อาจพิจารณาฉีด 2 เข็ม ต่อปี ห่างกัน 6 เดือน)
เพื่อรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม		

ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีความเสี่ยงต่ำ

ฉีด 1 เข็ม ต่อปี (ตามความสมัครใจ)

- หมายเหตุ
- กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการรับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อ (นอกเหนือจากกลุ่ม 607) แต่ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 2 เข็มต่อปี สามารถรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจ ภายใต้บริบทวัคซีนในแต่ละพื้นที่
 - คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคและข้อมูลทางวิชาการในอนาคต
 - **เด็กที่อายุ 6 เดือน - 1 ปี ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนและไม่เคยติดเชื้อมาก่อน แนะนำฉีดตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ฉีด primary series ตามการขึ้นทะเบียนของวัคซีนในอายุนั้นๆ (วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน แนะนำฉีด 3 เข็ม)
 - สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ที่เหมาะสม) อยู่ระหว่างหารือกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย